

## Prospecto : información para el usuario

### VENOSMIL 20 mg/g gel

Hidrosmina

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles .
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

#### Contenido del prospecto:

1. Qué es Venosmil gel y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Venosmil gel
3. Cómo usar Venosmil gel
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Venosmil gel
6. Contenido del envase e información adicional

#### 1. Qué es Venosmil y para qué se utiliza

Venosmil es un medicamento venotónico: aumenta el tono de las venas y la resistencia de los capilares (pequeños vasos sanguíneos).

Venosmil se utiliza en adultos para el alivio local a corto plazo (durante 2-3 meses) del edema y síntomas relacionados con la insuficiencia venosa crónica (dolor, pesadez de piernas, hinchazón, etc.).

#### 2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Venosmil

##### No use Venosmil

- si es alérgico (hipersensible) a hidrosmina o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).
- en afecciones de la piel, tales como dermatitis, eczemas o urticarias.
- sobre mucosas, ni zonas de la piel irritadas o heridas.

##### Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a usar Venosmil.

- usar solo sobre la piel intacta.
- evite el contacto con los ojos y mucosas, el oído y la boca.
- no aplicar simultáneamente en la misma zona que otros medicamentos de uso cutáneo.
- no utilizar de forma prolongada sin control médico.

##### Niños y adolescentes

- no se debe utilizar en niños y adolescentes a no ser que su médico se lo indique.

#### **Uso de Venosmil con otros medicamentos**

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

No se conocen interacciones con los alimentos ni con otros medicamentos, en todo caso nunca debe usar otro medicamento por iniciativa propia sin que se lo haya recomendado su médico.

No aplicar simultáneamente en la misma zona que otros medicamentos de uso cutáneo.

#### **Embarazo y lactancia**

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

#### **Conducción y uso de máquinas**

La influencia de VENOSMIL sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante.

#### **Venosmil contiene parahidroxibenzoato de metilo (E-218) y parahidroxibenzoato de propilo (E-216).**

Este medicamento puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas) porque contiene parahidroxibenzoato de metilo (E-218) y parahidroxibenzoato de propilo (E-216) (ver sección 4. “Posibles efectos adversos”).

### **3. Cómo usar Venosmil**

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

La dosis recomendada es: 3 -4 centímetros de gel 3 veces al día.

#### **Instrucciones para la correcta administración del preparado**

##### Adultos:

Uso exclusivamente cutáneo sobre piel intacta

1. Desenroscar la tapa del tubo y con la parte posterior de la tapa perforar suficientemente la boca metálica.
2. Extender sobre la zona afectada, aproximadamente 3-4 cm de gel, según necesidad, 3 veces al día realizando un pequeño masaje para favorecer la absorción del producto.

Se deben lavar las manos después de cada aplicación a fin de evitar un contacto involuntario con ojos y mucosas.

Si empeora, no mejora o se produce irritación en la zona tratada, deberá consultar al médico.

#### **Si usa más Venosmil del que debe:**

Hasta ahora no se han comunicado intoxicaciones con este medicamento, ni siquiera en casos de sobredosis accidental.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o acuda a un centro médico, o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

### **Si olvidó usar Venosmil**

No aplique una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Aplíquelo tan pronto como lo recuerde y prosiga con la pauta habitual.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

## **4. Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Durante el periodo de utilización de Venosmil gel se han producido algunos efectos adversos cuya frecuencia no se ha podido determinar con exactitud:

- Reacciones de hipersensibilidad (alérgicas) al principio activo o a alguno de sus excipientes (ver sección 2 “Qué necesita saber antes de empezar a usar Venosmil”).
- Erupción y picor en la piel en la zona de aplicación.

Estas reacciones desaparecen cuando se interrumpe el tratamiento.

### **Comunicación de efectos adversos:**

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaRAM.es/>. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

## **5. Conservación de Venosmil**

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

Conservar por debajo de 30°C.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

## **6. Contenido del envase e información adicional**

### **Composición de Venosmil gel**

- El principio activo es hidrosmina. Cada gramo de gel contiene 20 mg de hidrosmina.
- Los demás componentes (excipientes) son carbómero, trietanolamina, parahidroxibenzoato de metilo (E218), parahidroxibenzoato de propilo (E216) y agua destilada.

**Aspecto del producto y contenido del envase**

VENOSMIL se presenta en tubo de aluminio de 60 g conteniendo un gel transparente de color amarillento.

**Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación**

FAES FARMA, S.A.  
C/ Máximo Aguirre, 14  
48940 Leioa

**Fecha de la última revisión de este prospecto: Octubre 2014**

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es/>