DYNAMOGÉN

AMPOLLAS BEBIBLES

COMPOSICIÓN

Cada ampolla bebible de 10 ml contiene:

Glutodina (a Cetoglutarato de ciproheptadina) ..... 3 mg
Aspartato de Arginina .....…….. 1 g
Sacarosa .....…….. 3,575 g
Sorbitol solución 70% .....…….. 4,875 g
Sorbato de potasio (E202), esencia de frambuesa, ácido clorhídrico, colorante amaranto (E123), agua, c.s.

PROPIEDADES

Dynamogén posee como característica fundamental su acción orexígena y vigorizante. Para el logro de dicha actividad es necesaria la actuación de dos sustancias capaces de destruir la astenia psicofísica y la falta de apetito: la Glutodina (síntesis FAES FARMA, S.A.) y el Aspartato de Arginina.

INDICACIONES

Las indicaciones serán todos aquellos procesos en los que es preciso aportar elementos básicos capaces de realizar una activación energética: astenia y psicoastenia, anorexia, desnutrición, convalecencia, disminución de la capacidad intelectual, retrasos del desarrollo, adinamia, fatiga escolar, etc.

POSOLOGÍA

En el **niño**, la posología es la de una ampolla bebible dos veces al día, de preferencia media hora antes de las dos principales comidas.

En el **adulto**, dicha posología debe ser aumentada hasta tres ampollas bebibles al día. Esta dosis de tres ampollas cada 24 horas, se empleará, del mismo modo, en niños con anorexias muy rebeldes o deficiencias ponderales importantes.

ADVERTENCIAS

Advertencias sobre excipientes

Este medicamento contiene 3,575 g de sacarosa por cada ampolla bebible de 10 ml, lo que deberá ser tenido en cuenta en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de absorción de glucosa/galactosa, deficiencia de sacarasa-isomaltasa y pacientes diabéticos.

Este medicamento contiene 3,41 g de sorbitol como excipiente por cada ampolla bebible de 10 ml. Puede causar molestias de estómago y diarrea. No debe utilizarse en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa.

Por contener sorbato de potasio como excipiente es perjudicial para pacientes con dietas pobres en potasio. El exceso de potasio puede producir, después de la administración oral, molestias de estómago y diarrea.

Este medicamento contiene colorante amaranto como excipiente. Puede causar reacciones de tipo alérgico, incluido asma especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetil salicílico.

CONTRAINDICACIONES

Por su contenido en a Cetoglutarato de ciproheptadina, no debe utilizarse en madres lactantes ni en niños prematuros o recién nacidos.
Aunque no existen contraindicaciones, no es aconsejable el empleo del preparado en insuficiencias graves hepato-renales.

PRECAUCIONES
Se debe administrar con precaución en pacientes ancianos, con hipertrofia prostática sintomática y en enfermos con glaucoma de ángulo cerrado.

Por precaución no debe utilizarse durante el embarazo.

INCOMPATIBILIDADES E INTERACCIONES
No debe administrarse simultáneamente con inhibidores de la MAO.

No se debe administrar conjuntamente con medicamentos anticolinérgicos, neurolépticos o antidepresivos tricíclicos, puesto que cabe la posibilidad de que se potencien sus acciones anticolinérgicas.

No es conveniente asociar Dynamogén a hipnóticos y tranquilizantes mayores en evitación de una posible sumación de efectos inductores del sueño.

Puede potenciar el efecto del alcohol.

EFECTOS SECUNDARIOS
El a Cetoglutarato de ciproheptadina puede originar una ligera somnolencia que normalmente no se presenta tras unos días de administración continuada del fármaco. Este efecto conviene tenerlo en cuenta si se ha de conducir automóviles, manejar maquinaria, etc.

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO
La ingestión masiva, sobre todo por un niño, podría originar desde depresión o estimulación del SNC hasta convulsiones. Inducir al vómito, dando antes un vaso de agua. Si no vomita, hágase un lavado de estómago con suero salino. También son útiles los catárticos salinos (leche de magnesia, p. ej.). Si se produjera hipotensión, debe emplearse algún vasopresor. En cualquier caso, se recomienda ingreso hospitalario.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.

PRESENTACIÓN
Dynamogén se presenta en estuche con 20 ampollas bebibles de 10 ml.

MODO DE EMPLEO

1. Separar la ampolla.



2. Rasgar girando la lengüeta de la parte superior.

3. Después de invertirla, apretar la ampolla y verter el contenido en un vaso.

Con receta médica.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

FAES FARMA, S.A.
Máximo Aguirre, 14 – 48940 Leioa